

BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante

USO VETERINÁRIO

PARA USO EM INCUBATÓRIOS, AVIÁRIOS, GRANJAS DE SUÍNOS E INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO ANIMAL, CLINICAS VETERINÁRIAS, INSTALAÇÕES PARA ANIMAIS E OVOS PARA INCUBAÇÃO.

BACTERICIDA – FUNGICIDA – VIRICIDA

FÓRMULA: Cada 100 mL contém

Orto-fenil-fenol.....	7,92 g
O-benzil-p-clorofenol	9,97 g
P-tetra-aminofenol	1,95 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Reg. No. To Be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
PERIGO

INFORMES DE PRECAUÇÃO

Perigoso para Humanos e Animais Domésticos

CORROSIVO: Pode causar dano aos olhos e irritação de pele. Pode causar queimaduras severas. Prejudicial ou fatal se ingerido ou absorvido pela pele. Não aspirar vapor ou aerossóis. Evitar contato com olhos, pele e roupas. Usar óculos ou máscaras e luvas de borracha quando do manuseio. Evite contaminação de alimentos. Lave as mãos vigorosamente após manipulação.

PERIGOS QUÍMICO E FÍSICO: Inflamável. Não use ou armazene próximo do calor ou chamas.

INFORME DE TRATAMENTO PRÁTICO

SE INALADO – Tomar ar fresco.

SE EM CONTATO COM A PELE – Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos.

SE EM CONTATO COM OS OLHOS – Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Chamar um médico.

SE INGERIDO – Beber grande quantidade água. Evitar álcool. Contatar o médico imediatamente.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Provável dano de mucosa pode contra-indicar o uso de lavagem gástrica. Medidas contra choque circulatório, depressão respiratória e convulsão podem ser necessárias.

DESCRIÇÕES:

BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante é um desinfetante fenólico líquido destinado a promover, simultaneamente, limpeza sem sabão e ação germicida, fungicida e desodorante na presença de matéria orgânica.

INDICAÇÕES:

BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante é recomendado como desinfetante em incubatórios, aviários, granjas de suínos e instalações de produção animal, clinicas veterinárias e instalações para animais. Também pode ser usado como sanitizantes de ovos para incubação.

DILUIÇÕES:

- Para desinfetar superfícies limpas de instalações e para sanitização de incubadoras e ovos para incubação: 4 mL de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante em 1 litro de água.
- Para limpeza e desinfecção de superfícies muito sujas: 12 mL de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante em 1 litro de água.
- Para utilização em pedilúvios: 8 mL de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante em 1 litro de água
- Quando da utilização por nebulização em:
 - (a) Sanitização das sala do incubatório: misture 1 (uma) parte de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante com 5 (cinco) partes de água – 1,8 litros de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante em 9,0 litros de água.
 - (b) Sanitização de incubadoras e nascedouros por nebulização:
Diluição 1:1,8 mL de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante em 3,6 litros de água
Diluição 2:4,0 mL de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante em 1,0 litros de água
 - (c) Sanitização de instalações de aves e bovinos: misture 1 (uma) parte de BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante com 2 (duas) partes de água.

ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL:

- (a) Retirar os animais e alimentos das instalações, bem como veículos, engradados e baias a serem tratadas.
- (b) Remover toda cama, resíduos dejetos do solo, paredes e corredores de locais ocupados por animais.
- (c) Esvaziar comedouros e bebedouros compatível.
- (d) Limpar toda superfície com água, ou com água misturada com detergente compatível.
- (e) Saturar toda superfície com BioSentry[®] BioPhene[™] Desinfetante na diluição recomendada usando escova, pano, esponja ou equipamento de aspersão. Pequenos objetos (pás, enxadas, ancinhos) podem ser imersos. Superfícies tratadas devem permanecer saturadas pelo menos por 10 minutos para a efetiva ação germicida.
- (f) Ventilar os prédios, veículos, engradados e baias e demais locais fechados. Somente depois das superfícies totalmente secas os animais podem ser transferidos para instalações e os equipamentos utilizados.
- (g) Escove vigorosamente com detergente e enxágüe com água potável equipamentos de distribuição de ração e água antes da reutilização.

APRESENTAÇÕES:

Galões HDPE com conteúdo de 3,785 litros e tambores centendo 208,175 litros.

BioSentry® BioPhene™ Desinfetante é eficaz contra os seguintes agentes:

BACTÉRIAS E FUNGOS:

Alcaligenes faecalis
Aspergillus fumigatus
Brevibacter ammoniagenes
Brucella abortus
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium (Streptococcus faecalis)
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma iners
Pasteurella multocida
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella choleraesuis
Salmonella enteritidis

VÍRUS:

Bronquite infecciosa
 Doença de Bursa/Gumboro
 Doença de Newcastle
 Gastroenterite transmissível
 Laringotraqueite aviária
 Parainfluenza
 Parvovirose canina
 Pseudorraiva

ORIENTAÇÕES PARA USO POR NEBULIZAÇÃO

Para sanitização de incubadoras e nascedouros: Preparar uma solução estoque na diluição 1* recomendada a este tipo de aplicação. Nebulize as incubadoras e nascedouros com 90-240 mL desta solução imediatamente após a transferência. Repita diariamente nas incubadoras, e a cada 12 horas nos nascedouros. Interrompa o tratamento da incubatório 24 horas antes de carregar. Não permita que pessoas inalem ou entrem em contato com o nebulizador e não entrem nas máquinas até que o nebulizador tenha decantado que ocorre em 30-60 minutos. É também satisfatório nebulizar incubadoras e nascedouros com a diluição 2* a cada hora ou a intervalos diferentes. Neste caso, nebulize por 30-90 segundos a cada hora ou a cada 2 horas.

* Veja item DILUIÇÕES deste rótulo.

Para sanitização das salas do incubatório: Feche a sala para que o nebulizado permaneça confinado. Prepare uma solução na diluição recomendada. Ajuste o bocal do nebulizador em uma abertura adequada da sala. Com a válvula aberta no máximo, nebulizar por (1) minuto para cada 120m² de espaço. Não permita que pessoas aspirem ou entre em contato com o nebulizado ou entrem nas salas até que o nebulizado esteja totalmente decantado ou exaurido. Normalmente isto ocorre em 1-2 horas.

Para sanitização de instalações de aves e bovinos: Após seguir os itens (a), (b), (c) e (d) especificados em “ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL” confira se realmente as pessoas, aves e bovinos foram retirados e feche as janelas, portas, persianas, cortinas, etc., mantendo as instalações bem fechadas. Prepare uma solução na diluição

recomendada. Abra a válvula no máximo e nebulize o prédio ou a sala a ser tratada.

Use todo o galão (3,79 litros) de BioSentry® BioPhene™ Desinfetante para cada 600-800 m² de área. O nebulizador pode ser colocado em uma abertura na porta ou no prédio. A abertura deve ser ampla o suficiente para acomodar o bocal. Após a nebulização, manter o prédio fechado por 24 horas e depois deste tempo, o nebulizado deve ter-se assentado e pode ser aberto e arejado. Antes de repovoar com aves e bovinos, as instalações devem permanecer abertas por 24-48 horas.

ORIENTAÇÕES PARA USO EM INCUBADORAS DE OVOS DE GALINHAS:

(para limpeza e desinfecção de incubadoras, nascedouros, carrinhos, bandejas, prateleiras, equipamentos, utensílios e outras superfícies do incubatório)

Efetue prévia limpeza e desinfecção com BioSentry® BioPhene™ Desinfetante na diluição recomendada. Enxágüe e reaplique a solução recente do desinfetante. Não enxágüe. Em incubatório não é recomendado limpeza e desinfecção em 1 etapa apenas.

ORIENTAÇÕES PARA USO EM OVOS PARA INCUBAÇÃO:

Aplique BioSentry® BioPhene™ Desinfetante da diluição recomendada por imersão, espuma, aspersão sob baixa pressão, umedecimento ou nebulização. Temperatura recomendada da água é de 24°C – 44°C.

CUIDADOS E RESTRIÇÕES DE USO:

O nebulizado gerado na aplicação do produto é muito irritante para os olhos e membranas mucosas. Sob nenhuma circunstância entrar em locais sanitizados até que o nebulizado se decante (aproximadamente 2 à 4 horas após a aplicação). Em caso de necessidade de adentrar em estes recintos, as pessoas deverão usar máscaras, óculos e roupas adequadas. Comedores e bebedouros que não foram removidos para tratamento do recinto, ou que não foram adequadamente cobertos para prevenir contato com o tratamento deverão ser lavados com detergente a água antes da reutilização.

USE ESTE PRODUTO APENAS SOBRE OVOS A SEREM INCUBADOS, NÃO APLIQUE EM OVOS DE CONSUMO.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE

Não contaminar água, alimentos ou ração durante armazenagem ou descarte. Aterros sanitários abertos são proibidos. Armazenar apenas em embalagens originais. Não reaproveitar embalagens vazias. Antes do descarte das embalagens, enxágüe-as 3 vezes e envie para reciclagem, acondicionamento ou corte e leve a um aterro sanitário, inciere. É produto tóxico para peixes. Não descarte efluente contendo este produto em lagos, rios, lagoas, estuários, oceanos ou outros recursos hídricos a menos que esteja de acordo com a legislação do Lançamento de Efluentes e com a permissão de Lançamento de Efluentes e com permissão escrita d autoridade competente.

LOTE N^o:

FABR.:

VENC.:

NUM. DE SUB-PARTIDA:

<p>Medical 1-651-523-0318 (International) ? 1-800-621-8829</p>

**FABRICADO PARA:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.**

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
DuPont do Brasil S.A.
Rodovia Pres. Castelo Branco, 12.870 Parte A Bairro
Jardim Maria Cristina
06421-300 Barueri-SP / CNPJ: 61.064.929/0057-23
Fone: (11) 41668746 * Fax: (11) 41668746**

BioSentry[®] is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
BioPhene[™] is a Trademark of Neogen Corporation.

Item No.: D12709568-BZL
Net Contents: 3.785 Litros (1 Galão)
UPC: 023626 25980 (5)
Format: UPC-A
Label: In-House Label

Item No.: D12709568-bzl
Net Contents: 4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galão)
UPC: 00023626 25985 (0)
Format: Interleaved 2-of-5
Label: Case Label

Code NU.NO.