

Ramik Vert^{MD}

TUE RATS ET SOURIS

RODENTICIDE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, POUR LE CONTRÔLE DES SOURIS, DES RATS
ET DES ÉCUREUILS TERRESTRES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.

GARANTIE:

Diphacinone
(2-Diphénylacétyle -1, 3-Indandione).....0,005%

NO. D'ENREGISTREMENT 11669 EPA Est. No. 61282-WI-1
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS**

AVERTISSEMENT, contient l'allergène
Blé, Soja et Poisson.

Ce produit contient du propionate de calcium à raison
de 1,0 % à titre d'agent de conservation.

COMMERCIAL**PREMIERS SOINS:**

Contact avec les yeux, rincer à l'eau au moins 15 minutes.

Contact avec la peau, bien laver au savon et à l'eau.

Si avalé, donner 1 à 2 verres d'eau et faire vomir en insérant un doigt dans le fond de la gorge ou un objet arrondi. Répéter jusqu'à ce que le vomissement soit clair. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ELEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbe par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc lors de manipulation de produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipuler ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT: Ne pas jeter dans des lacs, rivières ou étangs.

L'utilisation d'appâts anticoagulants présente un danger certain d'empoisonnement secondaire pour les prédateurs et les oiseaux. Enlever et enterrer autant que possible tous les corps de rongeurs trouvés au-dessus du sol.

POUR CONTRÔLER: Rats et souris (à l'intérieur et à l'extérieur) et les écureuils terrestres (de type Colombien, Franklin, rayés et Richardson), dans les basses-cours, champs de récoltes, pépinières, endroits résidentiels et gazonnés (décoratifs ou pour le sport) et potagers.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Les vitamines K₁ administrées sous forme d'injections intraveineuses, intramusculaires ou sous-cutanées ou par ingestion orale sont conseillées comme traitement palliatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement de temps de prothrombine prolongé (P.T.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si ces traitements répétés s'imposent.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter les appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences locales. Suivre les directives provinciales concernant le nettoyage du contenant avant son élimination. Rendre le contenant vide impropre à une utilisation ultérieure. Se débarrasser du contenant conformément aux exigences provinciales. Pour de plus amples renseignements sur l'élimination des restes de produits ou sur le nettoyage des déversements accidentels, communiquer avec l'organisme provincial chargé de la réglementation du produit ou avec le fabricant.

ÉLIMINATION DES RONGEURS: Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

MODE D'EMPLOI: On peut utiliser ce produit dans les lieux humides ou détremés comme les berges de rivière, les voies de chemin de fer, les lieux de chargement, dans ou autour des trous de rats, sous les greniers, le long des palissades, dans les décharges, etc. A l'extérieur, le produit doit être placé dans des boîtes inviolables. On peut aussi utiliser efficacement ce produit dans des endroits secs à l'intérieur des bâtiments et en d'autres lieux protégés. Placer les appâts dans des boîtes inviolables le long des murs, dans les coins et dans des lieux masqués où les rats peuvent manger sans être dérangés.

Il faut s'assurer chaque jour qu'il reste suffisamment d'appât pour que les rongeurs en soient approvisionnés constamment. Maintenir un approvisionnement constant pendant au moins 15 jours. Appâter tant que les rongeurs continuent à se nourrir de l'appât. Remplacer l'appât s'il est humide et moisi.

RATS: Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point au moins 115 grammes d'appât.

SOURIS: Placer les appâts à 2-3 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point au moins 115 grammes en permanence pour éviter la réapparition des rongeurs.

ÉCUREUILS TERRESTRES: À la main: Déposer 15 grammes (200 boulettes) d'appât dans chaque trou. Revenir après 48 heures et déposer encore de l'appât dans les trous où on a mangé ou enlevé l'appât. Ne pas mettre d'autre appât dans les trous où l'ancien appât est resté tel quel. Une troisième visite pourra s'avérer nécessaire pour assurer un contrôle parfait.

Dans des contenants: Observer le nombre approximatif d'écureuils sur une période de deux jours. Placer, tous les 30 à 60 mètres, des contenants ou boîtes d'appâts inviolables. Utiliser un contenant pour chaque quantité de 50 écureuils et déposer 500 grammes d'appât dans chaque contenant. Vérifier tous les jours et approvisionner les contenants sans interruption pendant une période de trois semaines ou jusqu'à ce que les écureuils aient arrêté de manger l'appât.

IMPORTANT: Pour obtenir les meilleurs résultats, conserver le produit dans un récipient fermé, sans odeurs qui puissent contaminer l'appât et éloigner les rongeurs. Il se peut que les rongeurs mangent de l'appât à plusieurs reprises avant que les effets ne se fassent sentir. Leur mort peut donc prendre plusieurs jours.

Medical 1-800-498-5743

? 1-800-621-8829

Manufactured By:

Hacco, Inc.

110 Hopkins Drive

Randolph, WI 53956

Code (NG.NI) NA.NI

Item No.: 112952

Net Contents: 10 kg

UPC: 0 23626 01160 (1)

Format: UPC-A

Ramik® is a Registered Trademark of HACCO, Inc.